

中国丙型肝炎血清流行病学研究

陈园生 李黎 崔富强 邢文革 王璐 贾志远 周脉耕 龚晓红 王富珍
郑徽 罗会明 毕胜利 汪宁 杨维中 梁晓峰

【摘要】目的 了解中国现阶段丙型肝炎病毒(HCV)感染现状。方法 利用中国疾病预防控制中心“2006年中国乙型病毒性肝炎血清流行病学调查”保留的血清,以美国Murex 3.0和Ortho 3.0抗-HCV试剂为金标准建立标准血清库,筛选中国抗-HCV检测试剂,并用Chiron HCV RIBA 3.0复核检测结果。结果 中国1~59岁人群抗-HCV调整流行率为0.43%(95%CI:0.33%~0.53%),男性和女性抗-HCV流行率分别为0.46%和0.40%,城市和农村人群经调整后均为0.43%。东、中和西部地区人群抗-HCV流行率分别为0.37%(95%CI:0.21%~0.53%)、0.67%(95%CI:0.40%~0.94%)和0.31%(95%CI:0.20%~0.42%),3个地区人群抗-HCV流行率的差异无统计学意义;南方和北方地区人群抗-HCV流行率分别为0.29%(95%CI:0.21%~0.52%)和0.53%(95%CI:0.38%~0.64%)。结论 经综合性防治,目前中国属丙型肝炎低流行区。

【关键词】 丙型肝炎; 血清流行病学

A sero-epidemiological study on hepatitis C in China CHEN Yuan-sheng, LI Li, CUI Fu-qiang, XING Wen-ge, WANG Lu, JIA Zhi-yuan, ZHOU Mai-geng, GONG Xiao-hong, WANG Fu-zhen, ZHENG Hui, LUO Hui-ming, BI Sheng-li, WANG Ning, YANG Wei-zhong, LIAO Xiao-feng. Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050
Corresponding author: LIAO Xiao-feng, Email: Liangxf@hotmail.com

[Abstract] Objective To better understand and measure the status of hepatitis C virus (HCV) infection, we conducted a sero-epidemiological study using the remaining blood samples and data of the nationwide survey of hepatitis B in Chinese residents which was carried out in 2006. Methods The anti-HCV reagent was screened out from the reagents by the HCV infection blood serum plate with anti-HCV positives or negatives. This plate recognized the Murex 3.0 and Ortho 3.0 reagents as gold standards. Anti-HCV in the blood samples were tested using this reagent and confirmed by Chiron HCV RIBA 3.0 reagents. Results Among the population aged 1 year to 59 year-olds, the overall prevalence rate of anti-HCV was 0.43% (95%CI: 0.33%~0.53%), with the rates of anti-HCV among males and females as 0.46% and 0.40%, respectively. The prevalence rate of anti-HCV in urban area was 0.43%, and in rural area it was 0.43%. The prevalence rate of anti-HCV in the Eastern, Middle and Western areas were 0.37% (95% CI: 0.21%~0.53%), 0.67% (95% CI: 0.40%~0.94%) and 0.31% (95% CI: 0.20%~0.42%) respectively. The prevalence rates of anti-HCV for the three areas did not show significant differences, statistically. The prevalence rate of anti-HCV in the South and North areas were 0.29% (95%CI: 0.21%~0.52%) and 0.53% (95%CI: 0.38%~0.64%) respectively. Conclusion Our data revealed that China was in the low prevalence area for hepatitis C infection and the results also suggested that the comprehensive measures for HCV control and prevention had been successfully achieved in the country.

[Key words] Hepatitis C; Sero-epidemiology

丙型肝炎(丙肝)是一种以血液传播为主的传染性疾病,感染后易转变成慢性肝炎、肝硬化和肝细胞癌。我国是丙肝病毒(HCV)感染的高流行地区,抗-HCV流行率为0.9%~5.1%^[1]。为了解我国内丙肝的流行现状,本研究利用中国疾病预防控制中心

“2006年中国乙型病毒性肝炎血清流行病学调查”(2006年乙肝调查)的资料及血清库开展丙肝血清学研究。

材料与方法

1. 调查人群: 调查对象来自全国31个省份160个疾病监测点的1~59岁常住人群,即2006年乙肝调查收集的血清标本约8万人份,抽样方法和质量

控制见文献[2,3]。本次丙肝血清学检测标本78 937人份,与2006年乙肝调查数据库对接后,有效标本78 746人份用于数据分析。

2. 地区划分标准:

(1)东、中、西部地区划分标准^[2,3]:①东部地区(9个省、直辖市):北京、上海、辽宁、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东;②中部地区(10个省):河北、海南、湖北、湖南、安徽、江西、山西、河南、吉林、黑龙江;③西部地区(12个省、自治区、直辖市):陕西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、广西、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古。

(2)南北地区划分标准^[2,3]:①南方地区(15个省、自治区、直辖市):上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏;②北方地区(16个省、自治区、直辖市):北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、陕西、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古。

3. 方法:

(1)建立标准血清库:①从5个省血液中心收集抗-HCV阴、阳性样本各40份,-20℃保存;用美国Murex 3.0和Ortho 3.0的ELISA试剂筛查,对于阳性标本用Chiron HCV RIBA 3.0试剂确定;共建立72份标准血清库,其中抗-HCV阳性标本34人份,HCV阴性标本38人份。②建立标准血清库判定标准:若2种ELISA试剂皆阴性,该样本为抗-HCV阴性;若2种ELISA试剂皆阳性,HCV RIBA 3.0试剂为阳性,则该样本抗-HCV阳性;若2种ELISA试剂阴、阳性各一,HCV RIBA 3.0试剂阳性,则该样本抗-HCV阳性;若2种ELISA试剂阴、阳性各一,HCV RIBA 3.0试剂阴性,该样本抗-HCV阴性;若2种ELISA试剂为阳性或阴、阳性各一,HCV RIBA 3.0试剂为不确定或阴性,则剔除该样本。

(2)检测方法:用建立好的标准血清库对我国6种抗-HCV ELISA检测试剂进行筛查,选择敏感性和特异性均最好($\geq 95\%$)的丙肝抗体诊断试剂盒[英科新创(厦门)科技有限公司生产]检测所有样本;对抗-HCV阳性标本和处于“灰区”的抗-HCV阴性标本用美国雅培公司的(Murex 3.0)抗-HCV试剂重复检测,以复核结果为准。采用瑞士HAMILTON公司生产的FAME24/20型全自动酶联检测系统,在检测期间对美国Beckman自动化检测工作站每周进行调试。

4. 结果判定:①阳性样本界定值:临界值=阴性对照均值×3.8;②阳性样本判定标准:样品A值S/C.

≥ 1 判定为抗-HCV阳性;③阴性样本判定标准:样品A值S/C.O.<1判定为抗-HCV阴性;④“灰区”样本界定:设定临界值±15%的检测结果为“灰区”。

5. 统计学分析:采用SAS 9.1.3软件(版本号:0047174008)。统计方法和率的标准化见文献[2,3],由于本次调查属多阶段复杂抽样,因此点值的计算应权重,且采用泰勒级数线性法估算率的方差并构建点值估计率及其可信区间。

结 果

1. 样本及其构成:本次调查的有效样本共78 746人份,其中男性37 379人份,女性41 367人份。男、女性检测样本各年龄组构成比相仿(表1)。

表1 2006年全国丙肝血清流行病学调查人群的年龄、性别构成

年龄组 (岁)	男性		女性		合计	
	检测 人数	构成比 (%)	检测 人数	构成比 (%)	检测 人数	构成比 (%)
1~	7 888	21.10	6 849	16.56	14 737	18.71
5~	5 926	15.85	5 519	13.34	11 445	14.53
10~	5 937	15.88	5 619	13.58	11 556	14.68
15~	1 516	4.06	1 379	3.33	2 895	3.68
20~	1 032	2.76	1 516	3.66	2 548	3.24
25~	1 606	4.30	2 521	6.09	4 127	5.24
30~	2 500	6.69	3 619	8.75	6 119	7.77
35~	2 909	7.78	3 932	9.51	6 841	8.69
40~	2 595	6.94	3 510	8.49	6 105	7.75
45~	1 847	4.94	2 385	5.77	4 232	5.37
50~	2 116	5.66	2 730	6.60	4 846	6.15
55~59	1 507	4.03	1 788	4.32	3 295	4.18
合计	37 379	100.00	41 367	100.00	78 746	100.00

2. 抗-HCV 阳性率的城乡年龄别分布:1~59岁人群抗-HCV 阳性率为 0.40%, 调整率为 0.43% (95% CI: 0.33% ~ 0.53%)。城市人群抗-HCV 阳性率为 0.42%, 调整率为 0.43% (95% CI: 0.32% ~ 0.54%);农村人群抗-HCV 阳性率为 0.39%, 调整率为 0.43% (95% CI: 0.30% ~ 0.45%);城乡人群抗-HCV 阳性率的差异无统计学意义。城市<40岁人群抗-HCV 阳性率高于农村,而 40~59岁年龄组城市人群低于农村(表2)。全国人群抗-HCV 阳性率随年龄递增呈上升趋势,1~4岁年龄组儿童抗-HCV 阳性率最低(0.09%),50~55岁年龄组人群抗-HCV 阳性率最高(0.83%),各年龄组抗-HCV 阳性率均低于1992年调查结果(图1)。

3. 抗-HCV 阳性率的性别年龄别分布:全国人群男性抗-HCV 阳性率为 0.41%, 调整率为 0.46% (95% CI: 0.31% ~ 0.61%);女性抗-HCV 阳性率为

表2 我国1~59岁人群抗-HCV阳性率的城乡地区分布

年龄组(岁)	城市		农村		合计	
	检测人数	阳性率(%)	检测人数	阳性率(%)	检测人数	阳性率(%)
1~	7 232	0.11	7 505	0.07	14 737	0.09
5~	5 755	0.17	5 690	0.16	11 445	0.17
10~	5 656	0.39	5 900	0.14	11 556	0.26
15~	1 339	0.37	1 556	0.45	2 895	0.41
20~	1 279	0.31	1 269	0.24	2 548	0.27
25~	2 106	0.81	2 021	0.25	4 127	0.53
30~	3 234	0.68	2 885	0.62	6 119	0.65
35~	3 504	0.77	3 337	0.42	6 841	0.60
40~	3 081	0.58	3 024	0.63	6 105	0.61
45~	2 188	0.59	2 044	0.98	4 232	0.78
50~	2 243	0.49	2 603	1.11	4 846	0.83
55~59	1 526	0.46	1 769	0.90	3 295	0.70
合计	39 143	0.42	39 603	0.39	78 746	0.40
调整率(%)	-	0.43	-	0.43	-	0.43




图1 1992年和2006年我国不同年龄人群抗-HCV阳性率比较

0.40%，调整率为0.40% (95%CI: 0.27%~0.54%)，男性和女性抗-HCV 阳性率比较差异无统计学意义。50~59岁年龄组男性人群抗-HCV 阳性率最高 (0.99%)，1~4岁年龄组男性人群抗-HCV 阳性率最低 (0.08%) (表3)。

表3 我国不同年龄、性别人群抗-HCV阳性率分布

年龄组(岁)	男性		女性	
	检测人数	阳性率(%)	检测人数	阳性率(%)
1~	7 888	0.08	6 849	0.10
5~	5 926	0.22	5 519	0.11
10~	5 937	0.25	5 619	0.27
15~	1 516	0.53	1 379	0.29
20~	1 032	0.58	1 516	0.07
25~	1 606	0.62	2 521	0.48
30~	2 500	0.76	3 619	0.58
35~	2 909	0.58	3 932	0.61
40~	2 595	0.42	3 510	0.74
45~	1 847	0.81	2 385	0.75
50~	2 116	0.99	2 730	0.70
55~59	1 507	0.73	1 788	0.67
合计	37 379	0.41	41 367	0.40
调整率(%)	-	0.46	-	0.40

4. 抗-HCV 阳性率的地区分布：东部地区人群抗-HCV 阳性率为 0.27%，调整率为 0.37% (95%CI: 0.21%~0.53%)；中部地区人群抗-HCV 阳性率为 0.54%，调整率为 0.67% (95%CI: 0.40%~0.94%)；西部地区人群抗-HCV 阳性率为 0.40%，调整率为 0.31% (95%CI: 0.20%~0.42%)，3个地区人群抗-HCV 阳性率的差异无统计学意义。东部地区城市和农村人群抗-HCV 阳性率均为 0.27%；中部地区城市和农村人群抗-HCV 阳性率分别为 0.48% 和 0.61%；西部地区城市和农村人群抗-HCV 阳性率分别为 0.52% 和 0.28% (表4)。

表4 我国东、中、西部地区人群抗-HCV阳性率的城乡分布

地区	城市		农村		合计	
	检测人数	阳性率(%)	检测人数	阳性率(%)	检测人数	阳性率(%)
东部	13 142	0.27	13 161	0.27	26 303	0.27
中部	13 231	0.48	13 241	0.61	26 472	0.54
西部	12 770	0.52	13 201	0.28	25 971	0.40
南方	20 505	0.30	20 860	0.27	41 365	0.29
北方	18 638	0.55	18 743	0.51	37 381	0.53

南方地区人群抗-HCV 阳性率为 0.29%，调整率为 0.36% (95%CI: 0.21%~0.52%)；北方地区人群抗-HCV 阳性率为 0.53%，调整率为 0.51% (95%CI: 0.38%~0.64%)。南方地区城市和农村人群抗-HCV 阳性率分别为 0.30% 和 0.27%，北方地区城市和农村人群抗-HCV 阳性率分别为 0.55% 和 0.51% (表4)。

讨 论

丙肝呈世界性分布，不同性别、年龄、种族、民族人群均是 HCV 易感者，成年人 HCV 感染率高于儿童。全世界抗-HCV 流行率为 3%，由此推算全球有 1.2 亿至 2 亿人曾感染过 HCV。但各国 HCV 感染率高低不一^[4-11]，我国属 HCV 感染的高流行区，抗-HCV 流行率为 3.20%^[1]，估算全国 HCV 感染者约 4000 万。

本次调查结果显示，我国 1~59 岁人群抗-HCV 流行率为 0.43%，表明在全球范围内属 HCV 低流行地区，由此推算我国目前 HCV 感染者约 560 万。调查还显示 1~4 岁人群 HCV 抗体阳性率最低 (0.09%)，50~59 岁年龄组人群 HCV 抗体阳性率最高 (0.77%)，即大年龄组人群 HCV 抗体阳性率相对较高，年龄越小，其 HCV 抗体阳性率越低。调查还显示我国中部地区人群抗-HCV 流行率 (0.54%) 略高于东部和西部地区人群抗-HCV 流行率 (0.27% 和

0.40%),北方人群抗-HCV 流行率(0.53%)明显高于南方地区人群,可能与该地区中的山西、吉林、黑龙江、湖北和河南等省人群中抗-HCV 阳性人数较多有关,其原因还需进一步研究。

与1992年全国病毒性肝炎血清流行病学调查结果(人群抗-HCV 阳性率3.20%)相比^[1],本次调查人群抗-HCV 阳性率下降86.56%,各年龄组人群抗-HCV 流行率均下降了近2个百分点,这可能与我国贯彻加强采供血机构监管和血源管理,提倡安全注射,开展健康教育和健康促进等综合性防控措施相关,也与我国抗-HCV 检测试剂特异性提高关系密切(1992年全国病毒性肝炎血清流行病学调查采用HCV 抗体检测试剂为第一代试剂^[1],而本次调查使用的是第三代检测试剂,其特异性较高)。

(本次调查得到北京大学医学部庄辉院士和中国肝炎基金会诸多专家的支持与指导,谨此感谢)

参 考 文 献

- [1] 戴志澄,祁国明. 中国病毒性肝炎血清流行病学调查(上卷),1992—1995. 北京:科学技术文献出版社,1995:60-71.
- [2] Liang XF, Bi SL, Yang WZ, et al. Epidemiological serosurvey of hepatitis B in China—declining HBV prevalence due to hepatitis B vaccination. *Vaccine*, 2009, 27: 6550-6557.
- [3] 卫生部. 全国人群乙型病毒性肝炎血清流行病学调查报告. 北京:人民卫生出版社,2011:1-70.

- [4] Alberti A, Benvegnù L. Management of hepatitis C. *J Hepatol*, 2003, 38 Suppl:S1042-1048.
- [5] Halasz R, Weiland O, Sallberg M. GB virus C/hepatitis G virus. *Scand J Infect Dis*, 2001, 33(8):572-580.
- [6] Zhuang H. Towards research on hepatitis C. *Chin J Hepatol*, 2004, 12(2):65-66. (in Chinese)
- [7] Shepard CW, Finelli L, Alter MJ. Global epidemiology of hepatitis C infection. *Lancet Infect Dis*, 2005, 5:558-567.
- [8] Esteban JI, Sauleda S, Quer J. The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe. *J Hepatol*, 2008, 48: 148-162.
- [9] Mele A, Tosti ME, Marzolini A, et al. Prevention of hepatitis C in Italy: lessons from surveillance of type-specific acute viral hepatitis. SEIEVA Collaborating Group. *J Viral Hepat*, 2000, 7: 30-35.
- [10] Stroffolini T. The changing pattern of hepatitis B virus infection over the past three decades in Italy. *Dig Liver Dis*, 2005, 37: 622-628.
- [11] Fabris P, Baldo V, Baldovin T, et al. Changing epidemiology of HCV and HBV infections in Northern Italy. A survey in the general population. *J Clin Gastroenterol*, 2008, 42:527-532.

(收稿日期:2011-05-10)

(本文编辑:张林东)

· 消息 ·

本刊现已实行“中华医学会信息管理平台”在线投稿

2010年中华医学会信息管理平台升级,本刊登录网址更新为中华医学会网站:<http://www.cma.org.cn>。在线投稿请点击首页上方“业务中心”。新老用户使用过程中具体注意如下:(1)第一次使用本系统进行投稿的作者,必须先注册,才能投稿。注册时各项信息请填写完整。作者自己设定用户名和密码,该用户名和密码长期有效。(2)已注册过的作者,请不要重复注册,否则将导致查询稿件时信息不完整。如果遗忘密码,可以从系统自动获取,系统将自动把您的账号信息发送到您注册时填写的邮箱中。向中华医学会系列杂志中不同杂志投稿时无须重复注册,进入系统后即可实现中华医学会系列杂志间的切换。本刊的审稿专家可使用同一个用户名作为审稿人进行稿件审理和作者投稿。(3)作者投稿请直接登录后点击“个人业务办理”,然后点击左上角“远程稿件处理系统”,在页面右上角“选择杂志”对话框中的“中华流行病学杂志”再点击“作者投稿”。投稿成功后,系统自动发送回执邮件。作者可随时点击“在线查稿”,获知该稿件的审稿情况、处理进展、审稿意见、终审结论等;有关稿件处理的相关结果编辑部不再另行纸质通知。投稿成功后请从邮局寄出单位介绍信,来稿需付稿件处理费20元/篇(邮局汇款),凡未寄单位介绍信和稿件处理费者,本刊将对文稿不再做进一步处理,视为退稿。如有任何问题请与编辑部联系,联系电话:010-58900730, Email:lxbonly@public3.bta.net.cn。

本刊编辑部

中国丙型肝炎血清流行病学研究

作者:

陈园生, 李黎, 崔富强, 邢文革, 王璐, 贾志远, 周脉耕, 龚晓红, 王富珍, 郑徽, 罗会明, 毕胜利, 汪宁, 杨维中, 梁晓峰, CHEN Yuan-sheng, LI Li, CUI Fu-qiang, XING Wen-ge, WANG Lu, JIA Zhi-yuan, ZHOU Mai-geng, GONG Xiao-hong, WANG Fu-zhen, ZHENG Hui, LUO Hui-ming, BI Sheng-li, WANG Ning, YANG Wei-zhong, LIANG Xiao-feng

作者单位:

中国疾病预防控制中心, 北京, 100050

刊名:

中华流行病学杂志

ISTIC PKU

英文刊名:

Chinese Journal of Epidemiology

年, 卷(期):

2011, 32(9)

参考文献(11条)

- 戴志澄;祁国明 中国病毒性肝炎血清流行病学调查(上卷), 1992-1995 1995
- Liang XF;Bi SL;Yang WZ Epidemiological serosurvey of hepatitis B in China-declining HBV prevalence due to hepatitis B vaccination[外文期刊] 2009
- 卫生部 全国人群乙型病毒性肝炎血清流行病学调查报告 2011
- Alberti A;Benvegnù L Management of hepatitis C 2003(Suppl)
- Halasz R;Weiland O;Sallberg M GB virus C/hepatitis G virus 2001(08)
- 庄辉 重视丙型肝炎的研究[期刊论文]-中华肝脏病杂志 2004(02)
- Shepard CW;Finelli L;Alter MJ Global epidemiology of hepatitis C infection[外文期刊] 2005(9)
- Esteban JI;Sanleda S;Quer J The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe[外文期刊] 2008
- Mele A;Tosti ME;Marzolini A Prevention of hepatitis C in Italy:lessons from surveillance of type-specific acute viral hepatitis. SEIEVA Collaborating Group[外文期刊] 2000(1)
- Stroffolini T The changing pattern of hepatitis B virus infection over the past three decades in Italy 2005
- Fabris P;Baldo V;Baldovin T Changing epidemiology of HCV and HBV infections in Northern Italy.A survey in the general population 2008

本文读者也读过(10条)

- 刘慧鑫, 王璐, 秦倩倩, 丁正伟, 汪宁, LIU Hui-xin, WANG Lu, QIN Qian-qian, DING Zheng-wei, WANG Ning 滞后诊断偏倚对判断艾滋病潜伏期的影响[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 周晓农, 杨国静, 杨坤, 李石柱, ZHOU Xiao-nong, YANG Guo-jin, YANG Kun, LI Shi-zhu 中国空间流行病学的发展历程与发展趋势[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 叶润华, 段松, 项丽芬, 杨跃诚, 杨忠桔, 韩文香, 曹东冬, 杨建华, 李维美, 杨锦, 王继宝, 高洁, 龚渝蓉, 杨世江, 朱萍, 何纳, YE Run-hua, DUAN Song, XIANG Li-fen, YANG Yue-cheng, YANG Zhong-jie, HAN Wen-xiang, CAO Dong-dong, YANG Jian-hua, LI Wei-mei, YANG Jin, WANG Ji-bao, GAO Jie, GONG Yu-rong, YANG Shi-jiang, ZHU Ping, HE Na 云南省德宏州无抗病毒治疗史的HIV感染者CD4+T淋巴细胞计数自然变化及其影响因素[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 黎健, 吴寰宇, 潘引君, 曹卫中, 钱杰, 任宏, 施阳, 李燕婷, LI Jian, WU Huan-yu, PAN Yin-jun, CAO Wei-zhong, QIAN Jie, REN Hong, SHI Yang, LI Yan-ting 上海市新生儿接种重组酵母乙型肝炎疫苗后低(无)应答情况及影响因素的研究[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 段松, 韩晶, 杨跃诚, 项丽芬, 叶润华, 龚渝蓉, 杨世江, 杨忠桔, 韩文香, 杨建华, 曹东冬, 李维美, 李洋, 唐仁海, 吴尊友, 何纳, DUAN Song, HAN Jing, YANG Yue-cheng, XIANG Li-fen, YE Run-hua, GONG Yu-rong, YANG Shi-jiang, YANG Zhong-ju, HAN Wen-xiang, YANG Jian-hua, CAO Dong-dong, LI Wei-mei, LI Yang, TANG Ren-hai, WU Zun-you, HE Na 1989-2010年云南省德宏州艾滋病病毒感染者死因分析[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 刘东磊, 陈萌, 卢莉, 吴疆, LIU Dong-lei, CHEN Meng, LU Li, WU Jiang 北京市1990-2010年风疹流行病学分析[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 叶小华, 许雅, 周舒冬, 鄢艳晖, 李燕芬, YE Xiao-hua, XU Ya, ZHOU Shu-dong, GAO Yan-hui, LI Yan-fen 广东省高中生健康素养影响因素多元多水平分析[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
- 曲成毅, QU Cheng-yi 进展缓慢的社会心理流行病学——在批判中发展[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(5)

9. 王素芳, 穆敏, 赵艳, 李湖中, 方炎福, 王海林, 李李, 胡传来, WANG Su-fang, MU Min, ZHAO Yan, LI Hu-zhong, FANG Yan-fu, WANG Hai-lin, LI Li, HU Chuan-lai 大学新生膳食模式及其影响因素的研究[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)
10. 张仲迎, 汤哲, 冯明, ZHANG Zhong-ying, TANG Zhe, FENG Ming 北京市城乡老年人预期寿命和健康预期寿命比较[期刊论文]-中华流行病学杂志2011, 32(9)

引证文献(3条)

1. 李杰, 陈杰, 庄辉 丙型肝炎的流行病学[期刊论文]-实用肝脏病杂志 2012(5)
2. 樊盼英, 孙定勇, 王哲 丙型肝炎流行病学研究进展[期刊论文]-中华流行病学杂志 2012(8)
3. 邱艳, 查伟, 杨海平, 孙莉, 郭瑾, 许志远, 修冰水 ORTHO抗-HCV酶联免疫试剂2种孵育试验程序在血液筛查中的比较研究[期刊论文]-中国输血杂志 2012(8)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zhlxbx201109009.aspx